

「おたふくかぜ」の検査

ふくおか耳鼻咽喉科

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町2-224-2

TEL (0562) 38-2800

検査方法は？

おたふくかぜの原因である「ムンプスウィルス」の抗体価を血液検査で調べます。IgMとIgGという2種類のムンプスウィルスの抗体価を調べることによって、以前「おたふくかぜ」にかかったことがあるか、現在かかっているかどうかを判断できます。



検査結果の見方は？

- IgM (-) IgG (+) : 以前に「おたふくかぜ」になったことがある、または予防接種で免疫がついている場合
- IgM (+) IgG (-) : 現在、「おたふくかぜ」にかかっている場合
- IgM (-) IgG (-) : 過去、現在において「おたふくかぜ」にかかったことがない場合

Q&A

Q 予防接種をしても、「おたふくかぜ」にかかることはありますか？

A 予防接種をしても免疫がつかない場合や、免疫がついても消えてしまうこともあるので、「おたふくかぜ」にかかることはあり得ます。

Q 「おたふくかぜ」に2回かかることはありますか？

A ありません。もし、2回以上耳の下が腫れたことがある場合は、「おたふくかぜ」以外の病気（**反復性耳下腺炎**など）を起こしていたことが考えられます。

はんぷくせいじ かせんえん

Q 反復性耳下腺炎とはどんな病気ですか？

A 原因はよくわかっていませんが、主にお子さんがかかる病気で、何度も耳の下が腫れ、患部が左右交互になることもあります。「おたふくかぜ」とは違い、3日前後で治ることが多いのが特徴です。

★症状が急に変わることもあります。疑問な点や困った事がありましたら、なるべく早目におたずねください。

おだいに
なさってください。

